



**Critères**

**Enviro & Ressources**

**Biodiversité**

- Végétale
- Animale

**Foncier**

**GES**

**Energie**

**Pollutions**

- Eau
- Sols
- Air

**Paysages**

**Foncier & impacts délocalisés**

**Adaptation systèmes aux territoires**

**Besoins ↔ Potentiel**

*Chgt climatique*

*Races? Sélection*

**Haies IAE (mares...)**  
% PN

**Races?**

**Taux d'engrais<sup>nt</sup>**  
**Empreinte foncière**  
*(hectares extérieurs)*

**SPEA\***

**Charg<sup>nt</sup> kgvv/ha**  
Saisonnalité?  
Race locale?

**Ration**  
% pâturage  
Qtité de concentrés  
Autres fourrages

**Viabilité éco**  
Transmissibilité  
Transfo locale

*Cohérence: de l'herbe pour des herbivores*

**Bien-être animal**

**Santé**

**Goût**

**Sens**

- Vente directe
- Filière territoriale, PAT
- Filière longue

**Attentes Conso**

Oméga 3/Oméga 6  
Caractère « pisseux »  
Tendreté  
Couleur  
Persillé  
Flaveur

**Complémentarités élevages lait/viande élevage mixte**

**Viabilité éco**  
Transmissibilité  
Transfo locale

**Satisfacation**  
Charge travail

**Emplois agricoles et ruraux**

**Attractivité métier**

**Bien-être des éleveurs**

**Activités éco & territoires**

\*Systèmes de Production Economiques et Autonomes